

1. *Agapornis canus*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

Tamanho: 14 cm

Patas, dedos e unhas: As unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola, mas é aceitável que esteja mais nervosa, e em boa condição física

1.1. Macho

Testa: Cinzento claro

Topo da cabeça: Cinzento claro

Faces: Cinzento claro

Garganta e parte superior do peito: cinzento claro

Olhos: Castanhos escuros

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Penas de cobertura inferiores: Pretas

Remiges: Verdes escuras

Uropigio: Verde, ligeiramente mais escuro que o corpo

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Igual ao corpo

Penas da cauda: Verde amarelado na base, com um anel preto, a ponta à verde

Pés: Cinzento claro

Unhas: Cinzento escuro

1.2. Fêmea

Testa: Verde com tons de cinzento

Topo da cabeça: Verde com tons de cinzento

Faces: Verde com tons de cinzento

Garganta e parte superior do peito: Verde-claro

Olhos: Castanhos escuros

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo mas mais claro que no macho

Penas de cobertura inferiores: Verde-claro

Remiges: Verdes escuras

Uropigio: Verde, ligeiramente mais escuro que o corpo

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Igual ao corpo

Penas da cauda: Verde amarelado na base, com um anel preto, a ponta à verde

Standards Agapornis

Pés: Cinzento claro

Unhas: Cinzento escuro

2. *Agapornis taranta*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga, no geral a ave deve transmitir uma imagem de força.

Tamanho: 17

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda.

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

2.1. Macho

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até meio do olho, **Topo da cabeça:** Verde claro

Faces: Verde claro

Garganta e parte superior do peito: Verde claro

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas vermelho vivo a envolver o olho

Bico: Vermelho vivo

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Penas de cobertura inferiores: Pretas

Remiges secundárias: Pretas

Remiges: Pretas com a parte externa preta

Uropigio: Verde

Penas de cobertura da cauda superiores: Ligeiramente mais claras que o Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro

Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação preta e acabando em verde, as centrais são pretas na ponta

Pés: Cinzento escuro

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

2.2. Fêmea

Testa: Verde claro

Topo da cabeça: Verde claro

Faces: Verde claro

Garganta e parte superior do peito: Verde claro

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas verdes a envolver o olho

Bico: Vermelho vivo

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro

Standards Agapornis

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Penas de cobertura inferiores: Pretas e verdes

Remiges secundarias: Pretas

Remiges: Pretas com a parte externa preta

Uropigio: Verde

Penas de cobertura da cauda superiores: Ligeiramente mais claras que o Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro

Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação preta e acabando em verde

Pés: Cinzento escuro

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

3. *Agapornis pullarius*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

Tamanho: 15 cm

Patas, dedos e unhas: As unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola, mas é aceitável que esteja mais nervosa, e em boa condição física

3.1. Macho

Testa: Banda vermelho alaranjado desde o bico até meio do olho,

Nuca: Verde claro

Faces e Garganta: Vermelho alaranjado, formando uma pequena mascara

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas amarelas a envolver o olho

Bico: Laranja

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Penas de cobertura inferiores: Verdes

Remiges: Verdes escuras com a parte externa verde

Uropigio: Azul céu

Penas de cobertura da cauda superiores: Verde claro

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro

Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação laranja e de uma banda preta e acabando em verde amarelado

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro

3.2. Fêmea

Testa: Banda alaranjada desde o bico até meio do olho,

Nuca: Verde claro

Standards Agapórnis

Faces e Garganta: Alaranjada, formando uma pequena mascara mais pequena e irregular que no macho
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas amarelas a envolver o olho
Bico: Laranja
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Penas de cobertura inferiores: Verdes
Remiges: Verdes escuras com a parte externa verde
Uropigio: Azul céu
Penas de cobertura da cauda superiores: Verde claro
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação laranja e de uma banda preta e acabando em verde amarelado
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro

4. *Agapornis roseicollis*

4.1. Normal

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga

Tamanho: 15 cm

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde claro

Faces: Rosa vivo, com uma clara diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Rosa vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verdes com a parte externa preta

Uropigio: Azul claro brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro

Standards Agapórnis

Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2. Standard

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga, no geral a ave deve ser claramente maior e mais possante que um roseicollie normal

Tamanho: 16 cm ou maior

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda, as narinas devem estar parcialmente cobertas

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verdes com a parte externa preta

Uropigio: Azul brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde

Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.1 Factor de escurecimento

4.2.1.1 Factor simples

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde escuro

Standards Agapórnis

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde escuro

Manto: Verde escuro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verdes com a parte externa preta

Uropigio: Azul escuro brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde escuro

Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.1.2. Factor duplo

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde oliva

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva

Manto: Verde oliva, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes oliva

Remiges: Verdes oliva com a parte externa preta

Uropigio: Cinzento

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva

Penas da cauda: Verde Oliva, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em cinzento

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.2. Aqua

Standards Agapórnis

Testa: Banda salmão desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde azulado

Faces: Rosa alaranjado em tom claro, contrastando com a testa salmão

Garganta e parte superior do peito: Rosa alaranjado em tom claro, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde azulado

Manto: Verde azulado, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verde azulado com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verde azulado com a parte externa preta

Uropigio: Azul brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde azulado

Penas da cauda: Verde azulado, com uma marca ao centro constituída por um núcleo salmão rodeado por negro e terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.3. Turquesa

Testa: Banda branca ou rosa muito claro desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas, é penalizável testas brancas com penas rosas

Topo da cabeça: Azul esverdeado

Faces: Branca

Garganta e parte superior do peito: Branca, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Azul esverdeado ou azul idealmente a ave deve ser homogénea na cor do corpo e não ter algumas zonas mais esverdeadas do que outras

Manto: Azul esverdeado ou azul, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo idealmente a ave deve ser homogénea na cor do manto e não ter algumas zonas mais esverdeadas do que outras

Remiges secundarias: Azul esverdeado ou azul com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Azul esverdeado ou azul com a parte externa preta

Uropigio: Azul brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul esverdeado ou azul

Penas da cauda: Azul esverdeado ou azul, com uma marca ao centro constituída por um núcleo branco ou rosa muito claro rodeado por negro e terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.4. Canela

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde canela

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde canela

Manto: Verde canela, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes canela com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verdes canela com a parte externa castanha

Uropigio: Azul claro brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde canela

Penas da cauda: Verdes canela, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por canela e terminando em azul claro

Pés: Cinzento castanho

Unhas: Claras

4.2.5. Ino

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Amarelo

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Vermelho, em aves adultas a cor vermelha pode não ser discernível com luz natural

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo

Manto: Amarelo, mais intenso que o resto do corpo

Remiges secundarias: Amarelo

Remiges: Brancas com a parte externa amarela

Uropigio: Branco

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo

Penas da cauda: Amarelas, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por branco e terminando em amarelo

Pés: Cinzento

Unhas: Cor de unha

4.2.6. Pálido

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Amarelo esverdeado

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo esverdeado

Manto: Amarelo esverdeado, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Cinzento claro

Remiges: Cinzento claro

Uropigio: Azul claro brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo esverdeado

Penas da cauda: Amarelas esverdeadas, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por cinzento e terminando em azul claro

Pés: Cor de carne, com tons de cinza

Unhas: Cor de carne, com tons de cinza

4.2.7. Face laranja

Testa: Banda laranja viva desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça: Verde

Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verdes com a parte externa preta

Uropigio: Azul brilhante

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde

Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo laranja rodeado por negro e terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.7. Opalino

Standards Agapornis

Testa: Vermelho vivo

Topo da cabeça e Nuca: Vermelho vivo

Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos-escuros

Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho

Bico: Cor de unha

Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro

Manto: Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado

Remiges: Verdes com a parte externa preta

Uropigio: Verde-claro, eventualmente com infiltrações de azul

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde

Penas da cauda: Vermelho esverdeadas

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

5. *Agapornis personatus*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser quadrada, o topo da cabeça é mais plano que noutros agapornis

Tamanho: 15 cm

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

5.1. Tipo selvagem

Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

Olhos: Castanhos-escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde

Manto: Verde mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verdes com a parte externa preta

Uropigio: Verde com tons mauvas, não são aceitáveis tons de azul ou violeta

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde

Penas da cauda: As centrais são verdes com a ponta mais clara, as secundárias são verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

5.2. Azul

Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição cinzenta para o pescoço e para a garganta

Garganta, pescoço e parte superior do peito: Branco

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Rosa claro

Parte inferior do peito e abdómen: Azul

Manto: Azul mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Azuis com a parte externa preta

Uropígio: Azul-escuro

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupígio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul

Penas da cauda: As centrais são azuis com a ponta mais clara, as secundárias são azuis com uma marca ao centro constituída por uma mancha branco sujo e uma banda preta terminando em verde

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

5.3. Factor de escurecimento

5.3.1. Factor simples

Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde escuro

Manto: Verde mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verde escuro com a parte externa preta

Uropígio: Verde escuro com tons mauvas, não são aceitáveis tons de azul ou violeta

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupígio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde escuro

Penas da cauda: As centrais são verde escuro com a ponta mais clara, as secundárias são verde escuro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

5.3.2. Factor Duplo

Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva

Manto: Verde oliva mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verdes oliva com a parte externa preta

Uropigio: Verde oliva com tons cinzento

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva

Penas da cauda: As centrais são verde oliva com a ponta mais clara, as secundárias são verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

5.4. Lutino

Testa, Topo da cabeça e faces: Vermelho, o mais bem marcado possível sem zona de transição laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

Olhos: Vermelhos

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo

Manto: Amarelo mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Amarelo com a parte externa branca

Uropigio: Amarelo com penas brancas isoladas

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: amarelo

Standards Agapórnis

Penas da cauda: As centrais são amarelas com a ponta mais clara, as secundárias são amarelas com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda branca terminando em amarelo

Pés: Cor de unha

Unhas: Cor de unha

5.5. Pastel

Testa, Topo da cabeça e faces: Cinzento claro com laivos de vermelho, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente, se a ave não tiver a máscara claramente desenhada é uma falta grave

Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/cinzento no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro, de preferência com uma cor homogénea

Manto: Verde claro mais escuro que o resto do corpo de preferência com uma cor homogénea

Remiges: Cinzento claro, quase bege

Uropígio: Verde claro com tons mauvas claro

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropígio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro

Penas da cauda: As centrais são verdes claras com a ponta mais clara, as secundárias são verdes claras com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda cinzenta terminando em verde

Pés: Cinzento claro

Unhas: Cinzento claro

6. *Agapornis fischeri*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é mais arredondada do que no *personatus*.

Tamanho: 15 cm

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

6.1. Tipo selvagem

Standards Agapórnis

Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça e nuca: Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca

Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde

Manto: Verde mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

Remiges: Verdes com a parte externa preta azulada

Uropigio: Azul violeta

Penas de cobertura da cauda superiores: Azul violeta

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde

Penas da cauda: As centrais são verdes com a ponta mais clara, as secundárias são verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

6.2. Azul

Testa: Banda branca desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça e nuca: Capuz cinzento, com tons mais claros a medida que desce a nuca, mas sempre cinzento até à transição para azul, não pode haver branco

Faces: Branco sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

Garganta e parte superior do peito: Branco, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Azul

Manto: Azul mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

Remiges: Azul com a parte externa preta azulada

Uropigio: Azul violeta

Penas de cobertura da cauda superiores: Azul violeta

Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul

Penas da cauda: As centrais são azuis com a ponta mais clara, as secundárias são azuis com uma marca ao centro constituída por uma mancha branca e uma banda preta terminando em azul

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

6.3. Factor de escurecimento

6.3.1. Factor simples

Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça e nuca: Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca

Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde escuro

Manto: Verde escuro mais acentuado que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

Remiges: Verde escuro com a parte externa preta azulada

Uropigio: Azul violeta escuro

Penas de cobertura da cauda superiores: Azul violeta escuro

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde escuro

Penas da cauda: As centrais são verdes escuro com a ponta mais clara, as secundárias são verdes escuro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

6.3.2. Factor Duplo

Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça e nuca: Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca

Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

Olhos: Castanhos escuros

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva

Manto: Verde oliva mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

Remiges: Verdes oliva com a parte externa preta

Uropigio: Cinzento

Penas de cobertura da cauda superiores: Cinzento

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva

Penas da cauda: As centrais são verdes oliva com a ponta mais clara, as secundárias são verdes oliva com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde oliva

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento

6.4. Lutino

Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça e nuca: Amarelo com ligeiras infiltrações de laranja no topo da cabeça

Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido

Olhos: Vermelhos

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo

Manto: Amarelo mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Amarelas com a parte externa branca

Uropígio: Branca

Penas de cobertura da cauda superiores: Branca

Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelas

Penas da cauda: As centrais são amarelas com a ponta mais clara, as secundárias são amarelas com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda branca terminando em amarelo

Pés: Cor de unha

Unhas: Cor de unha

6.5. Pastel

Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

Topo da cabeça e nuca: Capuz amarelo acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca, mas é importante que o capuz seja claramente visível, se não o for a ave deve ser penalizada

Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

Olhos: Castanhos

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho

Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro

Standards Agapórnis

Manto: Verde-claro mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

Remiges: Verdes claro com a parte externa cinzenta

Uropigio: Azul

Penas de cobertura da cauda superiores: Azul

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro

Penas da cauda: As centrais são verdes claro com a ponta mais clara, as secundárias são verdes claro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda cinzenta terminando em verde

Pés: Cinzento claro

Unhas: Cinzento claro

7. *Agapornis nigregenis*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

Tamanho: 13.5 cm

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

7.1. Tipo selvagem

Testa: Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base superior do bico

Topo da cabeça: Castanho ferrugem mudando para verde dourado depois da linha do olho

Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e ligeiramente mais claras na zona de transição

Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro

Manto: Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verde-claro com a parte externa preta

Uropigio: Verde claro, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não julgável

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde-claro

Penas da cauda: Verdes, as secundárias são verdes com uma marca castanho ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando em verde-claro

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

7.2. Azul

Testa: Cinza claro com uma estreita banda preta na base do bico

Topo da cabeça: Cinza claro clareando depois da linha do olho

Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e ligeiramente mais claras na zona de transição

Garganta: Branco, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Rosa na ponta, mais claro na base

Parte inferior do peito e abdómen: Azul-claro

Manto: Azul-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Azul-claro com a parte externa preta

Uropigio: Azul-claro, qualquer sinal de azul-escuro é motivo para a ave ser considerada não julgável

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul-claro

Penas da cauda: Azuis, as secundárias são azuis com uma marca cinza seguindo-se uma banda negra e terminando em azul claro

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

7.3. Factor de escurecimento

7.3.1 Factor simples

Testa: Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base do bico

Topo da cabeça: Castanho ferrugem mudando para verde dourado depois da linha do olho

Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e ligeiramente mais claras na zona de transição

Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Verde

Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verde com a parte externa preta

Uropigio: Verde, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não julgável

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde

Penas da cauda: Verdes, as secundárias são verdes com uma marca castanho ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando em verde-claro

Pés: Cinzento

Standards Agapórnis

Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

7.3.1 Factor Duplo

Testa: Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base do bico

Topo da cabeça: Castanho ferrugem mudando para verde azeitona depois da linha do olho

Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e mais ligeiramente mais claras na zona de transição

Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva

Manto: Verde oliva, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verde oliva com a parte externa preta

Uropigio: Verde oliva, qualquer sinal de cinza é motivo para a ave ser considerada não julgavel

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva

Penas da cauda: Verde oliva, as secundarias são Verde oliva com uma marca castanho ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando no tom de verde mais claro

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

7.2. Lutino

Testa: Laranja

Topo da cabeça: Amarelo

Faces: Marcação típica, as faces são laranjas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são laranjas com infiltrações de branco junto ao bico e ligeiramente mais laranjas na zona de transição, se a ave não apresentar branco junto ao bico é uma falta grave

Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

Olhos: Vermelhos

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo

Manto: Amarelo

Remiges: Amarelo com a parte externa branco

Uropigio: Amarelo, qualquer sinal de branco é motivo para a ave ser considerada não julgavel

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo

Penas da cauda: Amarelo, as secundarias são amarelas com uma marca alaranjada seguindo-se uma banda branca e terminando em amarelo

Pés: Cor de unha

Unhas: Cor de unha

8. *Agapornis lilianae*

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

Tamanho: 13.5 cm

Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

8.1. Tipo selvagem

Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta: A máscara é muito típica com um desenho muito bem definido, é de cor laranja, o laranja é ligeiramente mais forte na testa, a máscara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar, entre a máscara e o verde do corpo existe uma zona de transição verde amarelado característica

Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro

Manto: Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Verde-claro com a parte externa preta

Uropígio: Verde-claro, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não julgável

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropígio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde-claro

Penas da cauda: Verdes, as secundárias são verdes com uma marca laranja amarelado seguindo-se uma banda negra e terminando em verde amarelado

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento-escuro

8.2. Azul

Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta: A máscara é muito típica com um desenho muito bem definido, é de cor branca, a máscara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar, entre a máscara e o azul do corpo existe uma zona de transição cinzenta

Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Rosa na ponta, mais claro na base

Standards Agapórnis

Parte inferior do peito e abdómen: Azul-claro

Manto: Azul-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

Remiges: Azul-claro com a parte externa preta

Uropigio: Azul-claro, qualquer sinal de azul de um tom diferente ao do corpo é motivo para a ave ser considerada não julgável

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul-claro

Penas da cauda: Azuis, as secundárias são azuis com uma marca laranja amarelado seguindo-se uma banda negra e terminando em azul esbranquiçado

Pés: Cinzento

Unhas: Cinzento-escuro

8.3. Lutino

Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta: A máscara é muito típica com um desenho muito bem definido, é de cor laranja, o laranja é ligeiramente mais forte na testa, a máscara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar

Olhos: Vermelhos com a íris mais clara

Anel ocular: Anel branco a envolver o olho

Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo

Manto: Amarelo

Remiges: Amarelo com a parte externa branca

Uropigio: Amarelo, qualquer sinal de branco é motivo para a ave ser considerada não julgável

Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio

Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo

Penas da cauda: Amarelo, as secundárias são amarelo com uma marca laranja amarelado seguindo-se uma banda branca e terminando em amarelo

Pés: Cor de unha

Unhas: Cor de unha